


## 1. Når beina ikke henger med...


Tekst og foto: Wivian K. Tallachsen, publisert i SiOrBaJas medlemsblad nr. 3 2006

I to kull på rad har vi hatt en eller flere kattunger med noe som var tilsynelatende feil med beina. Etter mye prøving og feiling, har vi lært en del om hva som fungerer i forhold til fysioterapi for en liten kattunge, og selvsagt - hva som ikke fungerer.

Første gang det skjedde var «froglegs» det eneste vi hadde hørt om av diagnoser på noe som var galt med beina. Vi antok at beina da ville ligge bakover som på en frosk, men kunne ikke se at dette var tilfelle hos våre kattunger. Den ene forlabben var vridd innover ved «albueleddet». Kattens tre andre bein var helt ok, og da hun var to uker ble hun medbrakt til veterinær. Men veterinæren kunne ikke si hva som var galt og ba oss vente noen uker for deretter å komme tilbake for å ta røntgenbilder av føttene.



Wikrita's Total Disorder (5 uker)



Wikrita's Total Disorder (4,5 mnd)

### Fysioterapi

Det gjorde vi, men i mellomtiden bedrev jeg en slags form for fysioterapi, hvor jeg dro og strakk i benet, og også masserte det. Jeg fant fram et vaskefat,

tømte lunka vann i, og lot den lille kroppen venne seg til vannet mens jeg holdt hodet. Jeg var svært nøye på at hodet ikke forsvant under vannet. Kattungen begynte å røre på seg da det ikke lenger var mulig for den å stå på beina på grunn av oppdriften. Vi holdt ikke på lenge, toppen 10 minutter, men jeg tror det var mindre. Denne svømmetreningen fortsatt vi med 2-3 ganger, men da nektet kattungen å samarbeide mer, og satte bakbeina resolutt i bunnen.

Hun var 4 uker da vi fikk tatt røntgenbilder. Flere veterinærer ble konsultert på ulike dyreklinikker, og det kom helt klart fram at dette var en bløtdelsskade som sannsynligvis hadde oppstått på grunn av for liten plass i livmoren. Labben hadde blitt liggende klemt fast slik at muskler og sener ikke fikk sjansen til å strekke seg ut eller trekke seg sammen, som de skal kunne gjøre når alt er normalt. I ukene og månedene som fulgte, ble hun stadig tryggere når det gjaldt å komme seg fram på egen hånd, og sammen med de to søstrene var leken og farten deres over gulvene til tider noe helt utrolig.

11 uker gammel tok jeg kullet med til vaksinerings, og nå klarte ikke veterinæren å peke ut hvilken kattunge som hadde hatt trøbbel med foten, fordi de alle hadde samme farge og så like ut.

### En liten frosk

I neste kull kom det en enslig kattunge som hadde beina strukket bakover. Det var da jeg skjønnte hvorfor man kalte det «froglegs». Bare kort tid i forveien hadde jeg lest om en annen kattunge som hadde denne tilstanden og som døde, dog ikke av beinstillingen. Håpet var likevel ikke stort.

Men jeg satte i gang igjen. Det virket som han ikke klarte å bøye leddene i bakbeina, så jeg dro og kløp i potene for å få han til å reagere. Han og jeg skrek nesten om kapp før han omsider skjønnte at smerten fra klypet forsvant når han trakk til seg foten.

3 uker gammel kunne han fremdeles ikke gå. Han trakk seg framover med forlabbene, mens bak labbene ble slept etter. Da gikk det opp for meg at forholdene var langt fra ultimate - alle gulv og flater var for glatte.

Sporenstreks dro jeg til Biltema og kjøpte et sett med gummimatter som hadde et lite nett av kvadrater. Og det hjalp umiddelbart. Han skjønnte at han kunne bruke de små gummikvadratene som støtte, og nå klarte han å sette beina under seg.

Jeg la gummimatter inni kassen og ut på gulvet for at han skulle ha skikkelig underlag hele veien fra soveplassen til tissekassen, til matskålen og tilbake igjen. Selvsagt var jeg redd for at han ville begynne å tisse på en av gummimattene, men det skjedde aldri. Etter sitt første måltid, som ikke var mammas melk, gikk han opp i tissekassen uten veiledning eller hjelp, og hylte høyt mens han satte seg til rette.

### **Sprekken og leken**

Da han var 5 uker gammel syntes det ikke lenger at han hadde hatt beina vendt bakover tidligere. Han spratt og løp omkring som vanlige kattunger. I skrivende stund er han 9 uker, og akkurat så rampete og vill som alderen tilsier. Nå henger beina med, og når han skal vaksineres, skal han også undersøkes med røntgen for å se om man kan se noe unormalt. Og mer enn det kan jeg vel ikke gjøre?